noi e...

l'antimateria

Livio Lanceri - UniTS, Dipartimento di Fisica
Prolusione all'Anno Accademico 2014-2015

L'antimateria nella stampa quotidiana

- nel 1996, pochi mesi dopo la fabbricazione dei primi atomi di anti-idrogeno ai laboratori CERN di Ginevra
- “Libération” (6 gennaio 1996): copertina e lungo articolo
- “Primi passi nell’*antimondo*”

l'antimateria in un bestseller, “Angels and Demons”

Nel momento stesso in cui materia e antimateria vengono in contatto, tutta la loro massa si trasforma in energia: questo significa che è possibile liberare una quantità enorme di energia senza produrre inquinanti chimici o radioattivi. Basterebbero quantità minime di antimateria per rifornire di energia una città come New York.

Dal contatto fra un grammo di antimateria e un grammo di materia si sprigiona la stessa quantità di energia di una bomba atomica da 20 chiloton, come quella sganciata su Hiroshima.

Impossibile fare a meno di chiedersi se questa sostanza altamente volatile salverà il mondo o verrà usata per creare l'arma più letale che sia mai esistita.

un bestseller, “Angels and Demons”

Nel momento stesso in cui materia e antimateria vengono in contatto, tutta la loro massa si trasforma in energia: questo significa che è possibile liberare una quantità enorme di energia senza produrre inquinanti chimici o radioattivi. Basterebbero quantità minime di antimateria per rifornire di energia una città come New York.

Dal contatto fra un grammo di antimateria e un grammo di materia si sprigiona la stessa quantità di energia di una bomba atomica da 20 chiloton, come quella sganciata su Hiroshima.

Impossibile fare a meno di chiedersi se questa sostanza altamente volatile salverà il mondo o verrà usata per creare l'arma più letale che sia mai esistita.

un bestseller, “Angels and Demons”

Nel momento stesso in cui materia e antimateria vengono in contatto, tutta la loro massa si trasforma in energia: questo significa che è possibile liberare una quantità enorme di energia senza produrre inquinanti chimici o radioattivi. Basterebbero quantità minime di antimateria per rifornire di energia una città come New York.

Dal contatto fra un grammo di antimateria e un grammo di materia si sprigiona la stessa quantità di energia di una bomba atomica da 20 chiloton, come quella sganciata su Hiroshima.

Impossibile fare a meno di chiedersi se questa sostanza altamente volatile salverà il mondo o verrà usata per creare l'arma più letale che sia mai esistita.

noi e l'anti-materia

- la scoperta (1927-1932)
- ma: serve a qualcosa? (sì !)
- ricerca: le frontiere attuali

meccanica quantistica ...

Energia classica

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

Equazione di Schrodinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

Erwin Schrodinger

meccanica quantistica ...

Energia classica

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

Equazione di Schrodinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

Erwin Schrodinger

elettroni negli atomi
funzione d'onda Ψ

meccanica quantistica ...

Energia classica

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

Equazione di Schrodinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi$$

Erwin Schrodinger

elettroni negli atomi
funzione d'onda Ψ

legami chimici,
struttura dei materiali, ...

... e relatività ?

... e relatività ?

luce:
fotoni

$$m = 0$$

$$v = c$$

$$= 300.000 \text{ km/s}$$

... e relatività ?

luce:
fotoni

$$m = 0$$

$$v = c$$

$$= 300.000 \text{ km/s}$$

elettroni

$$v < c$$

... e relatività ?

luce:
fotoni

$$m = 0$$

$$v = c$$

$$= 300.000 \text{ km/s}$$

elettroni

$$v < c$$

Energia relativistica

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2 \rightarrow ?$$

equazione d'onda
per particelle relativistiche,
con velocità vicina a c ?

l'equazione di Dirac

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = c \vec{\alpha} \cdot (-i\hbar \vec{\nabla}) \Psi + \beta mc^2 \Psi$$

α e β : matrici 4x4,

Ψ funzione d'onda a 4 componenti

l'equazione di Dirac

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = c \vec{\alpha} \cdot (-i\hbar \vec{\nabla}) \Psi + \beta mc^2 \Psi$$

α e β : matrici 4x4,
 Ψ funzione d'onda a 4 componenti

descrive elettroni relativistici,
ma anche qualcosa in più,
inaspettato

elettroni e positroni

funzioni d'onda a 4 componenti: OK (spin !), ma: $E < 0$?

$$\begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \\ \Psi_3 \\ \Psi_4 \end{pmatrix}$$

elettroni e positroni

funzioni d'onda a 4 componenti: OK (spin !), ma: $E < 0$?

elettroni e positroni

funzioni d'onda a 4 componenti: OK (spin !), ma: $E < 0$?

elettroni e positroni

funzioni d'onda a 4 componenti: OK (spin !), ma: $E < 0$?

elettroni e positroni

funzioni d'onda a 4 componenti: OK (spin !), ma: $E < 0$?

$$\begin{array}{l} \text{spin} \uparrow \\ \text{spin} \downarrow \\ \hline \text{spin} \uparrow \\ \text{spin} \downarrow \end{array} \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \\ \Psi_3 \\ \Psi_4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} E > 0 \quad \text{OK} \\ E < 0 \quad ?? \end{array}$$

Dirac (1927): idea brillante, ma difficile da accettare:

vuoto = mare di elettroni con $E < 0$

assenza di un elettrone ($q < 0, E < 0$) del mare =

= presenza di particella (antielettrone) con $q > 0, E > 0$

elettroni e positroni

funzioni d'onda a 4 componenti: OK (spin !), ma: $E < 0$?

$$\begin{array}{c}
 \text{spin} \begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} \\
 \hline
 \text{spin} \begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array}
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c} \Psi_1 \\ \Psi_2 \\ \Psi_3 \\ \Psi_4 \end{array} \right)
 \begin{array}{c}
 E > 0 \quad \text{OK} \\
 E < 0 \quad ??
 \end{array}$$

Dirac (1927): idea brillante, ma difficile da accettare:

vuoto = mare di elettroni con $E < 0$

assenza di un elettrone ($q < 0$, $E < 0$) del mare =

= presenza di particella (antielettrone) con $q > 0$, $E > 0$

Scoperta del positrone (1932)

Scoperta del positrone (1932)

- Millikan (Nobel 1924) assegna al suo studente Carl Anderson (n. 1905) la costruzione di un elettromagnete più potente

Scoperta del positrone (1932)

- Millikan (Nobel 1924) assegna al suo studente Carl Anderson (n. 1905) la costruzione di un elettromagnete più potente
- scopo: analizzare raggi cosmici, in camere a nebbia

Scoperta del positrone (1932)

- Millikan (Nobel 1924) assegna al suo studente Carl Anderson (n. 1905) la costruzione di un elettromagnete più potente
- scopo: analizzare raggi cosmici, in camere a nebbia
- le particelle, invisibili, lasciano traccia di goccioline nel vapore sopra-saturo

Scoperta del positrone (1932)

- Millikan (Nobel 1924) assegna al suo studente Carl Anderson (n. 1905) la costruzione di un elettromagnete più potente
- scopo: analizzare raggi cosmici, in camere a nebbia
- le particelle, invisibili, lasciano traccia di goccioline nel vapore sopra-saturo
- densità delle gocce $\Rightarrow$ massa

Scoperta del positrone (1932)

- Millikan (Nobel 1924) assegna al suo studente Carl Anderson (n. 1905) la costruzione di un elettromagnete più potente
- scopo: analizzare raggi cosmici, in camere a nebbia
- le particelle, invisibili, lasciano traccia di goccioline nel vapore sopra-saturo
- densità delle gocce $\Rightarrow$ massa
- dalla curvatura in campo magnetico $\Rightarrow$ carica elettrica (positiva o negativa)

Scoperta del positrone (1932)

- Carl Anderson scopre tracce misteriose...
- curvatura: particelle con carica positiva (protoni?)
- ma: densità di traccia non compatibile con il protone!

Scoperta del positrone (1932)

- Carl Anderson scopre tracce misteriose...
- curvatura: particelle con carica positiva (protoni?)
- ma: densità di traccia non compatibile con il protone!

Scoperta del positrone (1932)

- Carl Anderson scopre tracce misteriose...
- curvatura: particelle con carica positiva (protoni?)
- ma: densità di traccia non compatibile con il protone!

è un positrone !

Elettrodinamica Quantistica (QED)

Elettrodinamica Quantistica (QED)

1941-1948: interpretazione alternativa di $E < 0$ (Stueckelberg e Feynman)

Elettrodinamica Quantistica (QED)

1941-1948: interpretazione alternativa di $E < 0$ (Stueckelberg e Feynman)

Teoria relativistica dei campi quantizzati:
creazione e distruzione
di particelle e antiparticelle

QED: Feynman, Schwinger, Tomonaga
Nobel 1965

dopo il 1950: acceleratori

$$E = 1 \text{ eV}$$

dopo il 1950: acceleratori

$$E = 1 \text{ eV}$$

aumentare l'energia:
perchè ?

dopo il 1950: acceleratori

$$E = 1 \text{ eV}$$

aumentare l'energia:
perchè ?

Einstein: $E = mc^2$

dopo il 1950: acceleratori

$$E = 1 \text{ eV}$$

ciclotrone
1-10 MeV
1 MeV =
= 1.000.000 eV

aumentare l'energia:
perchè ?

Einstein: $E = mc^2$

sincrotrone
GeV - TeV
1 GeV = 1000 MeV
1 TeV = 1000 GeV

collider
urti "frontali"
esempio: LHC
7 + 7 TeV

Anti-protoni ?

troppo difficile trovarli nei raggi cosmici!

1955: produzione “artificiale” con acceleratore (Bevatron di Berkeley)

protoni ($E > 6.3 \text{ GeV}$) contro bersaglio

Nobel 1959: Segrè, Chamberlain

Anti-protoni ?

troppo difficile trovarli nei raggi cosmici!

1955: produzione “artificiale” con acceleratore (Bevatron di Berkeley)

protoni ($E > 6.3 \text{ GeV}$) contro bersaglio

Nobel 1959: Segrè, Chamberlain

Anti-protoni ?

troppo difficile trovarli nei raggi cosmici!

1955: produzione “artificiale” con acceleratore (Bevatron di Berkeley)

protoni ($E > 6.3 \text{ GeV}$) contro bersaglio

anti-protoni: identificati nell'annichilazione su idrogeno in camera a bolle:

Nobel 1959: Segrè, Chamberlain

Anti-protoni ?

troppo difficile trovarli nei raggi cosmici!

1955: produzione "artificiale" con acceleratore (Bevatron di Berkeley)

protoni ($E > 6.3 \text{ GeV}$) contro bersaglio

anti-protoni: identificati nell'annichilazione su idrogeno in camera a bolle:

Nobel 1959: Segrè, Chamberlain

Anti-protoni ?

troppo difficile trovarli nei raggi cosmici!

1955: produzione “artificiale” con acceleratore (Bevatron di Berkeley)

protoni ($E > 6.3$ GeV) contro bersaglio

anti-protoni: identificati nell'annichilazione su idrogeno in camera a bolle:

Nobel 1959: Segrè, Chamberlain

produzione di positroni

produzione di positroni

elettrone ($\sim GeV$)

produzione di positroni

elettrone ($\sim GeV$)

bersaglio tungsteno ($\sim 20mm$)

produzione di positroni

elettrone ($\sim GeV$)

bersaglio tungsteno ($\sim 20mm$)

produzione di positroni

produzione di positroni

produzione di positroni

produzione di positroni

produzione di positroni

produzione di positroni

produzione di anti-protoni

record: 30 miliardi di antiprotoni all'ora, a FermiLab

produzione di anti-protoni

record: 30 miliardi di antiprotoni all'ora, a FermiLab

produzione di anti-protoni

record: 30 miliardi di antiprotoni all'ora, a FermiLab

per ogni 1,000,000
protoni (120 GeV)
sul bersaglio

produzione di anti-protoni

record: 30 miliardi di antiprotoni all'ora, a FermiLab

per ogni 1,000,000
protoni (120 GeV)
sul bersaglio

raccolti circa 20
antiprotoni (8 GeV)